

AASC®

Cuestionario de evaluación de la agitación para cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer

Las personas con enfermedad de Alzheimer se pueden angustiar, frustrar o enojar con facilidad. Estos sentimientos pueden estar relacionados con la agitación, un síntoma frecuente de la enfermedad de Alzheimer.

En las siguientes preguntas se abordan conductas asociadas con la agitación que quizás haya observado en la persona a la que cuida.

Sus respuestas a estas preguntas pueden servirle para hablar con el profesional médico de la persona. Elija una respuesta por cada pregunta.

Nombre del/de la paciente _____ Fecha _____

1. ¿Ha notado alguna de las siguientes conductas y considera que difieren del comportamiento habitual o anterior de la persona?

	Sí	No
a. Repite movimientos o conductas (por ejemplo, se balancea, eleva el puño, apunta con un dedo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Camina de un lado a otro o está inquieto/a (no se puede quedar quieto/a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Dice insultos/obscenidades o ataca verbalmente a otras personas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Levanta la voz, vocifera o grita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Se resiste a recibir asistencia o cuidados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Lanza, golpea o rompe objetos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Trata de lastimarse o lastimar a otros (por ejemplo, agarra, pateo, golpea, muerde)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. ¿Alguna de estas conductas afecta de forma negativa las relaciones o actividades de la persona o su voluntad de recibir cuidados?

	Sí	No
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nota aclaratoria: Esta evaluación fue elaborada por el Departamento Internacional de Asuntos Médicos de Otsuka junto con un comité de expertos multidisciplinarios y contó con la financiación de Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc. AASC® es una herramienta de evaluación, no de diagnóstico.

Los criterios de agitación se basan en la definición de la Asociación Internacional de Psicogeriatría (IPA, por sus siglas en inglés) (Sano et al., 2023).

Referencias: 1. Clevenger C, et al. One Minute to Recognition: The Agitation in Alzheimer's Screener for Caregivers (AASC®). The Gerontological Society of America Annual Scientific Meeting; November 8-12, 2023; Tampa, FL. 2. Sano M, Cummings J, Auer S, et al. *Int Psychogeriatr.* 2023;1-13.

© 2023 Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc. Todos los derechos reservados.